

Miejsce  
na naklejkę  
z kodem szkoły

dysleksja

MMA-R1\_1P-072

# EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

## POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 180 minut

MAJ  
ROK 2007

### Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 – 11). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
3. W rozwiązaniach zadań przedstawiaj tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
7. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.
8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora.
9. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
10. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

*Życzymy powodzenia!*

Za rozwiązanie  
wszystkich zadań  
można otrzymać  
łącznie  
50 punktów

Wypełnia zdający przed  
rozpoczęciem pracy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESEL ZDAJĄCEGO

--	--	--

KOD  
ZDAJĄCEGO

**Zadanie 1. (5 pkt)**

Dana jest funkcja  $f(x) = |x-1| - |x+2|$  dla  $x \in \mathbb{R}$ .

- Wyznacz zbiór wartości funkcji  $f$  dla  $x \in (-\infty, -2)$ .
- Naszkiej wykres tej funkcji.
- Podaj jej miejsca zerowe.
- Wyznacz wszystkie wartości parametru  $m$ , dla których równanie  $f(x) = m$  nie ma rozwiązania.

a) Niech  $x \in (-\infty, -2)$ , wtedy:

$$x-1 < 0, \text{ czyli } |x-1| = -(x-1) \text{ oraz}$$

$$x+2 < 0, \text{ czyli } |x+2| = -(x+2).$$

Zatem dla  $x \in (-\infty, -2)$  otrzymujemy:


$$f(x) = -(x-1) - (-(x+2)) = -x+1+x+2 = 3.$$

Funkcja  $f$  dla  $x \in (-\infty, -2)$  jest funkcją stałą, a jej zbiorem wartości jest zbiór  $\{3\}$ .

b) Po zastosowaniu definicji wartości bezwzględnej funkcję  $f$  zapisuję w następującej postaci:

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{dla } x \in (-\infty, -2) \\ -2x-1 & \text{dla } x \in \langle -2, 1 \rangle \\ -3 & \text{dla } x \in \langle 1, \infty \rangle \end{cases}$$

Szkicuję wykres funkcji  $f$ .



Funkcja ma jedno miejsce zerowe w przedziale  $(-2,1)$  (co widać na sporządzonym wykresie).

Miejsce zerowe funkcji  $f$  wyznaczam, korzystając z jej wzoru w tym przedziale:

$$-2x - 1 = 0, \text{ stąd } x_0 = -\frac{1}{2}.$$

c) Równanie  $f(x) = m$  nie ma rozwiązań, gdy prosta o równaniu  $y = m$  nie przecina wykresu funkcji  $f$ , czyli dla  $m < -3$  lub  $m > 3$ .


**Zadanie 2. (5 pkt)**

Rozwiąż nierówność:  $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 1) + \log_{\frac{1}{3}}(5 - x) > \log_{\frac{1}{3}}(3(x + 1))$ .

Wyznaczam dziedzinę nierówności logarytmicznej:

$$x^2 - 1 > 0 \wedge 5 - x > 0 \wedge x + 1 > 0.$$

Rozwiązania tych nierówności zaznaczam na osi liczbowej:



Dziedziną danej nierówności jest przedział  $(1, 5)$ .

Korzystam ze wzoru na sumę logarytmów i otrzymuję nierówność równoważną:

$$\log_{\frac{1}{3}}[(x^2 - 1)(5 - x)] > \log_{\frac{1}{3}}(3(x + 1)).$$

Funkcja logarytmiczna przy podstawie  $\frac{1}{3}$  jest malejąca, więc po opuszczeniu

logarytmów i zmianie zwrotu nierówności otrzymuję nierówność równoważną:

$$(x^2 - 1)(5 - x) < 3(x + 1).$$

Przedstawiam ją w postaci iloczynowej:

$$(x - 1)(x + 1)(5 - x) < 3(x + 1)$$

$$(x - 1)(x + 1)(5 - x) - 3(x + 1) < 0$$

$$(x + 1)[(x - 1)(5 - x) - 3] < 0$$

$$(x + 1)(-x^2 + 6x - 8) < 0$$

$$-(x + 1)(x - 2)(x - 4) < 0$$


Rozwiązaniem nierówności jest suma przedziałów  $(-1, 2) \cup (4, \infty)$ .

Rozwiązaniem nierówności logarytmicznej jest część wspólna otrzymanego zbioru i dziedziny:  $(1, 2) \cup (4, 5)$ .

**Zadanie 3. (5 pkt)**

Kapsuła ładownika ma kształt stożka zakończonego w podstawie półkulą o tym samym promieniu co promień podstawy stożka. Wysokość stożka jest o 1 m większa niż promień półkuli. Objętość stożka stanowi  $\frac{2}{3}$  objętości całej kapsuły. Oblicz objętość kapsuły ładownika.

Sporządzam pomocniczy rysunek:



Zapisuję zależność między długością promienia stożka i jego wysokością:

$$h = r + 1.$$

Objętość  $V$  kapsuły zapisuję jako sumę objętości stożka i półkuli:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h + \frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot (r + 1) + \frac{2}{3}\pi r^3 \text{ stąd } V = \pi r^3 + \frac{1}{3}\pi r^2.$$

Zależność między objętością  $V_s$  stożka i objętością  $V$  kapsuły wynikającą z treści zadania ma postać:

$$V_s = \frac{2}{3}V, \text{ stąd}$$

$$\frac{1}{3}\pi r^2 \cdot (r + 1) = \frac{2}{3}\left(\pi r^3 + \frac{1}{3}\pi r^2\right)$$

$$\frac{1}{3}\pi r^2 (r + 1) = \frac{2}{3}\pi r^2 \left(r + \frac{1}{3}\right)$$

$$r + 1 = 2\left(r + \frac{1}{3}\right)$$


$$r = \frac{1}{3}.$$

Obliczam objętości  $V$  kapsuły ładownika:  $V = \frac{2\pi}{27}\text{m}^3.$

**Zadanie 4. (3 pkt)**

Dany jest trójkąt o bokach długości  $1$ ,  $\frac{3}{2}$ ,  $2$ . Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta.

Wykonuję rysunek pomocniczy, na którym zaznaczam poszukiwany kąt:



Wykorzystuję twierdzenie cosinusów do zapisania równania:

$(1)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2 - 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot \cos \alpha$  i obliczam wartość cosinusa kąta  $\alpha$ :

$$\cos \alpha = \frac{7}{8}.$$

Wartość funkcji sinus kąta  $\alpha$  wyznaczam z tożsamości trygonometrycznej

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

$$\sin^2 \alpha + \left(\frac{7}{8}\right)^2 = 1, \quad \sin^2 \alpha = \frac{15}{64}.$$

Kąt  $\alpha$  jest kątem ostrym, więc  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{8}$ .


**Zadanie 5. (7 pkt)**

Wierzchołki trójkąta równobocznego  $ABC$  są punktami paraboli  $y = -x^2 + 6x$ . Punkt  $C$  jest jej wierzchołkiem, a bok  $AB$  jest równoległy do osi  $Ox$ . Sporządź rysunek w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.

Aby sporządzić rysunek wyznaczam współrzędne wierzchołka danej paraboli:

$$y = -x^2 + 6x = -(x - 3)^2 + 9, \text{ więc wierzchołek paraboli ma współrzędne } (3, 9).$$

Wykonuję rysunek ilustrujący treść zadania:



Trójkąt  $ABC$  jest równoboczny, więc kąt  $BAC$  ma miarę  $60^\circ$ . Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty  $A$  i  $C$  jest więc równy  $\text{tg } 60^\circ = \sqrt{3}$ .

Wyznaczam równanie prostej  $AC$ :

prosta  $y = \sqrt{3}x + b$  przechodzi przez punkt  $C = (3, 9)$ , więc współczynnik  $b$  jest równy  $b = -3\sqrt{3} + 9$ .

Prosta  $AC$  ma równanie:  $y = \sqrt{3}x - 3\sqrt{3} + 9$ .

Aby wyznaczyć współrzędne punktu  $A$  rozwiązuję układ równań:

$$\begin{cases} y = \sqrt{3}x - 3\sqrt{3} + 9 \\ y = -x^2 + 6x \end{cases}$$

Po dokonaniu podstawienia  $y = -x^2 + 6x$  otrzymuję równanie

$\sqrt{3}x - 3\sqrt{3} + 9 = -x^2 + 6x$ , które po uporządkowaniu przyjmuje postać:

$$x^2 + x(\sqrt{3} - 6) + 9 - 3\sqrt{3} = 0.$$

Rozwiązaniem równania są liczby:  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 3 - \sqrt{3}$ .

Współrzędne punktów przecięcia prostej  $AC$  z parabolą  $y = -x^2 + 6x$  są więc następujące:  $(3 - \sqrt{3}, 6)$  oraz  $(3, 9)$ .

Punkt  $(3, 9)$  jest wierzchołkiem paraboli, więc punkt  $A$  ma współrzędne  $(3 - \sqrt{3}, 6)$ .

Współrzędne punktu  $B$  wyznaczam wykorzystując fakt, iż osią symetrii paraboli  $y = -x^2 + 6x$  jest prosta  $x = 3$ . Punkt  $B$  jest więc obrazem punktu  $A$  w symetrii względem tej prostej, czyli  $B = (3 + \sqrt{3}, 6)$ .



**Zadanie 6. (4 pkt)**

Niech  $A, B$  będą zdarzeniami o prawdopodobieństwach  $P(A)$  i  $P(B)$ . Wykaż, że jeżeli  $P(A)=0,85$  i  $P(B)=0,75$ , to prawdopodobieństwo warunkowe spełnia nierówność  $P(A|B) \geq 0,8$ .

Ponieważ  $P(A \cup B) \leq 1$  z własności prawdopodobieństwa, więc

$$1 \geq P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Stąd po przekształceniu otrzymuję:

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

$$P(A \cap B) \geq 0,85 + 0,75 - 1$$

$$P(A \cap B) \geq 0,6$$

Korzystam z definicji prawdopodobieństwa warunkowego:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \geq \frac{0,6}{0,75} \text{ i otrzymuję } P(A|B) \geq 0,8.$$

**Zadanie 7. (7 pkt)**

Dany jest układ równań: 
$$\begin{cases} mx - y = 2 \\ x + my = m \end{cases}$$

Dla każdej wartości parametru  $m$  wyznacz parę liczb  $(x, y)$ , która jest rozwiązaniem tego układu równań. Wyznacz najmniejszą wartość sumy  $x + y$  dla  $m \in \langle 2, 4 \rangle$ .

Rozwiązaniem układu równań 
$$\begin{cases} mx - y = 2 \\ x + my = m \end{cases}$$
 dla każdego  $m \in R$  jest para liczb

$$\begin{cases} x = \frac{3m}{m^2 + 1} \\ y = \frac{m^2 - 2}{m^2 + 1} \end{cases}$$

Sumę  $x + y$  zapisuję w postaci funkcji  $f(m) = \frac{m^2 + 3m - 2}{m^2 + 1}$ ,  $m \in R$ .

Aby znaleźć najmniejszą wartość sumy w danym przedziale obliczam pochodną

funkcji  $f$ : 
$$f'(m) = \frac{-3m^2 + 6m + 3}{(m^2 + 1)^2}$$
,  $m \in R$ .

Obliczam miejsca zerowe pochodnej funkcji  $f$ :

$$f'(m) = 0 \text{ gdy } -3m^2 + 6m + 3 = 0.$$

Rozwiązaniami równania są liczby:  $m_1 = 1 - \sqrt{2}$ ,  $m_2 = 1 + \sqrt{2}$ , przy czym  $m_1 \notin \langle 2, 4 \rangle$ .

Badam znak pochodnej w przedziale  $\langle 2, 4 \rangle$ :

Ponieważ  $f'(m) > 0$  dla  $m \in (2, 1 + \sqrt{2})$ , więc funkcja  $f$  jest rosnąca w przedziale

$\langle 2, 1 + \sqrt{2} \rangle$ . Ponieważ  $f'(m) < 0$  dla  $m \in (1 + \sqrt{2}, 4)$ , więc funkcja  $f$  jest

malejąca w przedziale  $(1 + \sqrt{2}, 4)$ .

Stąd wnioskuję, że funkcja  $f$  przyjmuje najmniejszą wartość w jednym z końców przedziału  $\langle 2, 4 \rangle$ .

Obliczam wartość funkcji  $f$  na końcach przedziału:  $f(2) = \frac{8}{5}$  oraz  $f(4) = \frac{26}{17}$

i porównuję otrzymane liczby.

Najmniejszą wartością sumy  $x + y$  jest  $f(4) = \frac{26}{17}$ .

**Zadanie 8. (3 pkt)**

Dana jest funkcja  $f$  określona wzorem  $f(x) = \frac{\sin^2 x - |\sin x|}{\sin x}$  dla  $x \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$ .


- Naszkiej wykres funkcji  $f$ .
- Wyznacz miejsca zerowe funkcji  $f$ .

Korzystam z definicji wartości bezwzględnej i zapisuję wzór funkcji  $f$

$$\text{w postaci: } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x - \sin x}{\sin x} & \text{dla } \sin x > 0 \\ \frac{\sin^2 x + \sin x}{\sin x} & \text{dla } \sin x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - 1 & \text{dla } \sin x > 0 \\ \sin x + 1 & \text{dla } \sin x < 0 \end{cases}$$

Szkic wykresu funkcji w podanym zbiorze jest następujący:



Na podstawie wzoru wyznaczam miejsca zerowe funkcji:

$$f(x) = 0 \text{ dla } x \text{ takich, że } \sin x - 1 = 0 \text{ lub } \sin x + 1 = 0,$$

$$\text{czyli dla } x = \frac{\pi}{2}, \text{ oraz } x = \frac{3\pi}{2}.$$

**Zadanie 9. (3 pkt)**

Przedstaw wielomian  $W(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$  w postaci iloczynu dwóch wielomianów stopnia drugiego o współczynnikach całkowitych i takich, że współczynniki przy drugich potęgach są równe jeden.

Dany wielomian  $W(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$  przedstawiam w takiej postaci, aby można było zastosować wzory skróconego mnożenia:

$$W(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 4x^2 + 4x - 1.$$

Grupuję wyrazy i przedstawiam wyrażenie w postaci różnicy kwadratów dwóch wyrażeń:  $W(x) = (x^2 - x)^2 - (2x - 1)^2$ .

Wykorzystuję wzory skróconego mnożenia do rozkładu wielomianu na iloczyn dwóch wielomianów stopnia drugiego:


$$\begin{aligned} W(x) &= (x^2 - x)^2 - (2x - 1)^2 = (x^2 - x + 2x - 1) \cdot (x^2 - x - 2x + 1) = \\ &= (x^2 + x - 1) \cdot (x^2 - 3x + 1). \end{aligned}$$

**Zadanie 10. (4 pkt)**

Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola powierzchni rombu wynosi  $\frac{\pi\sqrt{3}}{8}$ .

Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.

Sporządzam rysunek pomocniczy i wprowadzam następujące oznaczenia:  
 $a$  – długość boku rombu,  $r$  – promień koła wpisanego w romb,  $P_K$  – pole koła wpisanego w romb,  $P_R$  – pole rombu,  $\alpha$  – kąt ostry rombu.



Zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami  $P_K = \pi r^2$ ,  $P_R = a \cdot 2r$ .

Z warunków zadania wynika proporcja:  $\frac{P_K}{P_R} = \frac{\pi r^2}{a \cdot 2r} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8}$ , stąd  $\frac{r}{2a} = \frac{\sqrt{3}}{8}$ .

Z otrzymanej równości wyznaczam promień okręgu:  $r = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$ .

Z trójkąta prostokątnego  $AED$  wyznaczam sinus kąta  $\alpha$ :  $\sin \alpha = \frac{|DE|}{|AD|} = \frac{2r}{a}$

$$\sin \alpha = \frac{2 \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Zatem  $\alpha = 60^\circ$ .

**Zadanie 11. (4 pkt)**

Suma  $n$  początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego  $(a_n)$  wyraża się wzorem  $S_n = 2n^2 + n$  dla  $n \geq 1$ .

a) Oblicz sumę 50 początkowych wyrazów tego ciągu o numerach parzystych:

$$a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{100}.$$

b) Oblicz  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{3n^2 - 2}$ .

a) Wyznaczam wzór ogólny ciągu  $(a_n)$ , korzystając z własności sum częściowych ciągów:  $a_n = S_n - S_{n-1}$

$$a_n = 2n^2 + n - 2(n-1)^2 - n + 1 = 4n - 1.$$

Wyznaczam wartość wyrazu  $a_2 = 7$  i różnicy ciągu  $(a_2, a_4, \dots, a_{100})$ ,  $r = 8$ .

Obliczam sumę  $n = 50$  początkowych wyrazów ciągu o numerach

parzystych:  $S_{50} = \frac{2 \cdot 7 + (50-1) \cdot 8}{2} \cdot 50 = 10150$ .

b) Obliczam granicę ciągu  $\frac{S_n}{3n^2 - 2}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{3n^2 - 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{3n^2 - 2} = \frac{2}{3}.$$

**BRUDNOPIS**